

## Tipos de pruebas de sífilis

La prueba de sífilis se realiza a través de análisis de sangre. Hay pruebas rápidas y pruebas de extracción de sangre.

- Las pruebas rápidas tienen un período de ventana de 3 meses que puede detectar cualquier anticuerpo.
- Las pruebas rápidas no se pueden hacer si alguien alguna vez dio positivo en el pasado o recibió tratamiento, ya que siempre puede volverse reactivo incluso si no hay una infección activa.
- Una prueba de extracción de sangre puede detectar una infección activa, o incluso una infección pasada.
- Una extracción de sangre también verificará los títulos, que son una unidad de medida para la infección por sífilis.
- También se realizan pruebas de extracción de sangre para confirmar que el tratamiento de alguien funcionó.

## Divulgar a sus parejas

Decírselo a una pareja puede ser difícil, pero tenga en cuenta que la mayoría de las personas con una ITS no saben que la tienen. La sífilis puede ser perjudicial para la salud de alguien, por lo que es importante informar a las parejas para que puedan recibir tratamiento lo antes posible. Es posible transmitir la sífilis de un lado a otro, por lo que si alguien recibe tratamiento, debe esperar hasta que su pareja también esté libre antes de reanudar las relaciones sexuales.

**tellyourpartner.org**

También es un gran sitio que le permite enviar un mensaje de texto anónimo a su(s) pareja(s).

## Si alguien se ha quedado sin atención médica/sitios de prueba adicionales

**Colorado Health Network  
(Medicaid/Seguro medico)**

303-962-5317

**Denver Health Sexual Health Clinic  
(con o sin seguro medico)**

303-602-3540

**Planned Parenthood  
(medicaid/con o sin seguro medico)**

303-832-5069

**Su proveedor medico de atencion  
primaria**

## información proporcionada por:

<https://www.cdc.gov/std/syphilis/stdfact-syphilis.htm>

hey  
Denver!

**SEXUAL HEALTHCARE FOR EVERYBODY  
SALUD SEXUAL PARA TODOS**

# Guia de la Sífilis

**HeyDenver.org  
303-962-2880**

## ¿Que es la sífilis?

- La sífilis es una infección de transmisión sexual que puede causar graves problemas de salud y complicaciones o incluso la muerte si no se trata.
- Es una infección causada por la bacteria *Treponema Pallidum*.
- La sífilis se desarrolla en etapas y los síntomas varían en cada etapa.
- Es muy tratable.

## Como se transmite

- La sífilis se puede transmitir cuando las lesiones, las llagas o el chancro infectados entran en contacto con la piel suave de la membrana mucosa que se encuentra dentro de la vagina, la uretra o el recto.
- Se contagia más fácilmente durante la primera etapa (primaria) porque los síntomas generalmente pasan desapercibidos.
- La sífilis también se puede contraer por exposición a lesiones o llagas sifilíticas durante la etapa secundaria. Si hay llagas, pueden propagar fácilmente la bacteria de la sífilis.
- Las bacterias de la sífilis son extremadamente frágiles, no se pueden propagar durante el contacto con objetos como asientos de inodoro, toallas, piscinas o al compartir utensilios o ropa.
- La sífilis se puede transmitir durante el embarazo o durante el parto de padres a hijos.

## Preveniendo la transmision

Las prácticas sexuales más seguras como el uso de condones, las pruebas de rutina y hablar con las parejas sobre sus hábitos de prueba pueden ayudar a reducir la posible transmisión.

## Sintomas y Etapas

Sintomas pueden incluir:

- Chancros en la boca o los genitales
- Sarpullido a menudo en manos/pies/torso
- Fiebre leve
- Fatiga
- Dolor de la garganta
- Perdida de cabello
- Glandulas inflamadas
- Dolor de cabeza
- Dolor muscular
- La etapa primaria de la sífilis generalmente se caracteriza por la aparición de una sola llaga, conocida como chancro, dentro de los 10 a 90 días posteriores al contacto con la bacteria en el sitio de la infección. La llaga puede durar de tres a seis semanas. El chancro desaparecerá con o sin tratamiento. Sin tratamiento, la persona seguirá teniendo sífilis y puede transmitirla a otros.
- La etapa secundaria de la sífilis puede desarrollarse de 17 días a 6 1/2 meses después de la infección. Los síntomas pueden durar de 2 a 6 semanas. Los síntomas pueden incluir: una erupción áspera de color marrón rojizo. Los síntomas de la sífilis secundaria desaparecerán con o sin tratamiento, pero la enfermedad seguirá presente si no se trata. Luego entrará en una etapa latente, que no tiene signos ni síntomas.

- Ceguera
- Daño a los nervios, cerebro y corazón
- Glandilos linfaticos inflamados
- Demencia
- Muerte

- La sífilis latente se desarrolla de dos a más de 30 años después de la infección. Debido a que no hay signos ni síntomas, la única forma de detectar una infección durante el período latente es mediante un análisis de sangre.
- Los síntomas de la sífilis en etapa tardía o terciaria pueden ocurrir de 2 a 30 años o más después de la infección. Las complicaciones durante esta etapa pueden incluir: gomas, problemas con el corazón y los vasos sanguíneos, o trastornos crónicos del sistema nervioso, como ceguera, locura, parálisis y muerte. La sífilis latente se desarrolla de dos a más de 30 años después de la infección.

## Tratamiento

- La penicilina se usa para tratar la sífilis. Incluso si alguien tiene una verdadera alergia a la penicilina.
- La mayoría de los proveedores proporcionarán un examen de neurosífilis para ver si hay otros efectos de la infección.
- Se recomienda abstenerse de tener relaciones sexuales hasta que se confirme que el tratamiento ha funcionado o hasta que la persona ya no tenga síntomas.
- El tratamiento puede evitar que la infección empeore los síntomas, pero no puede revertir el daño causado por la sífilis.